

Последовательность действий при остановке кровообращения

Дефибрилляция показана - ФЖЖТ без пульса

* Оценка ритма и пульса после разряда не производится!

** Препараты (адреналин и амиодарон) вводятся во время компрессий в разных шприцах!

Оценка ритма – ФЖЖТ без пульса
Первый разряд (150-200 Дж бифазный или 360 монофазный) *
СЛР 30:2 - 2 минуты или 5 циклов
Оценка ритма – ФЖЖТ без пульса
Второй разряд (150-360 Дж бифазный или 360 монофазный) *
СЛР 30:2 - 2 минуты или 5 циклов
Оценка ритма – ФЖЖТ без пульса
Третий разряд (150-360 Дж бифазный или 360 монофазный) *
СЛР 30:2 - 2 минуты или 5 циклов
Адреналин 1 мг и Амиодарон (кордарон) 300 мг. **
Оценка ритма – ФЖЖТ без пульса
Четвертый разряд (150-360 Дж бифазный или 360 монофазный) *
СЛР 30:2 - 2 минуты или 5 циклов
Оценка ритма – ФЖЖТ без пульса
Пятый разряд (150-360 Дж бифазный или 360 монофазный) *
СЛР 30:2 - 2 минуты или 5 циклов
Адреналин 1 мг и Амиодарон (кордарон) 150 мг **
Оценка ритма – ФЖЖТ без пульса
Шестой разряд (150-360 Дж бифазный или 360 монофазный)
СЛР 30:2 - 2 минуты или 5 циклов
Оценка ритма – ФЖЖТ без пульса
Седьмой разряд (150-360 Дж бифазный или 360 монофазный)
СЛР 30:2 - 2 минуты или 5 циклов
Адреналин 1 мг. Вводится во время компрессий!
Оценка ритма – ФЖЖТ без пульса
и т. д. (анализ ритма–разряд–СЛР–введение препарата каждые 3-5 мин во время компрессий)

- Бифазный дефибрилятор: (если неизвестны рекомендации производителя) – разряды проводятся силой 200 - 200 - 360 Дж и далее 360 Дж

* Амиодарон вводится дважды до суммарной дозы 450 мг (300 мг и 150 мг) болюсно. Разведение в 10 мл 5 % раствора глюкозы.

* Адреналин вводится каждые 3-5 минут в дозе 1 мг (1 мл) в разведении 10 мл изотонического раствора хлорида натрия болюсно (через каждые 2 полных цикла СЛР 30:2) в течение всего периода проведения СЛР

* После внутривенного болюсного введения адреналина и амиодарона дополнительно ввести 10-20 мл изотонического раствора хлорида натрия и конечность приподнять на 10 -20 сек.

- Альтернативный путь введения препаратов – интратрахеальный. Доза препарата увеличивается в 2 раза. Разведение адреналина в 10 мл изотонического раствора хлорида натрия. После интратрахеального введения провести несколько вентиляций мешком Амбу

Кафедра неотложных состояний ФГБОУ ДПО ИСК ФМБА России