

К начальным регистрам позитивных нарушений относятся:

астенические
ипохондрические
паранойяльные

К начальным регистрам негативных синдромов относятся:

снижение психического тонуса
дисгармония психического склада
субъективно осознавание изменение личности

Депрессивно-идеаторное торможение выражается:

пессимистическим содержанием мыслей
медленном темпе течений мыслей
ощущение пустоты в голове

Для депрессивной триады характерно:

двигательная заторможенность, идеаторная заторможенность, пониженное настроение
меланхолический раптус
иллюзорные расстройств

Трудными для диагностики бывают состояния депрессии по типу:

ларвированной
иронической
улыбающейся

К простым вариантам маниакального синдрома относятся:

гневливая мания
веселая мания
спутанная мания

К сложной мании относятся:

веселая мания
дурашливая мания
экзальтированная мания

К отвлеченным навязчивостям относятся:

бесплодное мудрствование
навязчивый счет
разложение на отдельные слоги различных слов

Навязчивые ритуалы характеризуются:

действиями, движениями, возникающими совместно с другими образными навязчивостями, в качестве их «нейтрализатора»
отсутствием чувства сделанности, навязанности
невозможностью им противостоять

В легких случаях деперсонализации отмечается:

ощущение внутренней измененности, касающейся чувств и мыслей
ощущение измененности окружающего мира
снижение полноты восприятия окружающего мира

Признаками паранойяльной ипохондрии являются:

убежденность в наличии заболевания
наличие системы доказательств наличия болезни
настойчивое требование проведения разнообразных обследований

Ипохондрический синдром часто характеризуется наличием:

сенестопатий
чрезмерного, утрированного внимания к своему здоровью
некорректируемой убежденностью в наличии тяжелой болезни, при отсутствии ее объективных признаков

Для астенического синдрома характерно:

идеаторная и моторная заторможенность
психическая истощаемость
мистические расстройства

Навязчивые страхи (фобии) характеризуются:

непроизвольностью возникновения
осознанием их чуждости
большим разнообразием

Состояние дереализации характеризуется:

чувством собственной измененности
восприятием мира призрачным, блеклым
появлением зрительных галлюцинаций

Для истерических нарушений моторики характерны:

явления астазии, абазии
ступор
хаотические, беспорядочные, утрированно выразительные движения

Синдром сверхценных идей характеризуются:

наличием суждений, возникающих вследствие реальных событий, обстоятельств
доминирующим положением этих идей в сознании
возможностью их коррекции

К бредовым относятся идеи или суждения, которые:

абсурдны по своему содержанию
не в полной мере соответствуют действительности
не отражают действительности и не корректируются

Бредовое настроение характеризуется:

напряженностью, предчувствием надвигающейся катастрофы
необъяснимым, непреходящим беспокойством
ощущением измененности себя и окружающего мира

При интерпретативном бреде отмечается:

преимущественное нарушения абстрактного познания действительности
преимущественное нарушения чувственного познания действительности
построение системы бреда на цепи доказательств, обнаруживающим субъективную логику

К вариантам интерпретативного бреда относятся:

бред изобретательства
бред ревности
бред преследования

Признаками интерпретативного бреда являются:

преобладание образных представлений, растерянности
систематическая внутренняя работа над содержанием бреда
периодические расстройства сознания

К признакам вторичного (чувственного) бреда относятся:

отсутствие стройной логической системы доказательств
изменчивость, фрагментарность фабулы
яркая аффективная окрашенность переживаний

К признакам висцеральных галлюцинаций относятся:

ощущение присутствия в полостях тела или под кожей инородных предметов, насекомых и т.д.
ощущение ползания насекомых по телу
возможность точного описания источника ощущений

Признаками псевдогаллюцинаций являются:

их неконкретность, бесформенность
интерпроекция
наличие признаков нарушения сознания

Для острого галлюцинаторно-параноидного состояния характерно:

выраженная чувственная окрашенность болезненных нарушений
изменчивость бредовых переживаний
отсутствие тенденции к систематизации

Хронический галлюцинаторно-параноидный синдром характеризуется:

склонностью к систематизации бредовых идей
относительной не выраженностью аффективных проявлений
отсутствием страха, тревоги, растерянности

Маниакальные состояния включают в себя:

расстройство настроения
нарушение сна
ассоциативные нарушения

К импульсивным влечениям относятся:

дипсомания
дромомания
клептомания

Клиническая картина развернутого делирия характеризуется:

наплывом парейдолий, сценоподобных зрительных галлюцинаций
двигательным беспокойством
помрачением сознания

Для первой стадии делирия характерно:

наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях

развитие псевдогаллюцинаторных расстройств
расстройства сна, яркие сновидения

Мусситирующий делирий характеризуется:

психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели
невнятным, бессвязным бормотанием
эндокринными нарушениями

Делирий можно наблюдать при

острой стадии эпидемического энцефалита
интоксикациях
верно все перечисленное

К кратковременным расстройствам сознания по типу исключительных состояний относятся:

патологическое опьянение
сумеречные состояния
патологический аффект

Онейроидные состояния характеризуются:

наплывом ярких представлений
калейдоскопической сменяемостью переживаний
зачарованностью

К расстройствам памяти относятся:

гипермнезия
дисмнезия
все перечисленное

Ретроградная амнезия характеризуется

фрагментарной утратой памяти
выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из
бессознательного состояния
выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному
состоянию

Антероградная амнезия характеризуется:

утратой воспоминаний на период бессознательного состояния и период, предшествовавший ему
правильное поведение в запечатанном периоде
утратой воспоминаний на период, непосредственно следовавший за выходом из
бессознательного состояния

Под расстройством побуждений подразумевают:

извращение волевой активности
обездвиженность, ступор
все перечисленное

Под негативными нарушениями понимают:

расстройства личности
регресс энергетического потенциала
слабоумие

К расстройствам мышления относят:

лживость
паралогичность
некритичность

Сенестопатии это:

локализованные неприятные, тягостные ощущения
необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией
тягостные болевые ощущения в утраченной конечности

Малый истерический припадок характеризуется состоянием, при котором наблюдаются:

тонические и клонические судороги
массивная тоническая судорога с изгибанием тела в дугу
приступы рыдания, хохота

Бредовое настроение:

предшествует «кристаллизации бреда»
сопровождает бред на всем протяжении
выражает суть бредового синдрома

К кататимному бреду относятся:

бред преследования
бред воздействия
бред самообвинения, виновности

К персекуторному бреду относится:

бред преследования
бред виновности, самообвинения
бред ревности

Резидуальный бред это:

убежденность в действительности, реальном существовании, пережитых в психозе бредовых идей, представлений, сохраняющаяся в ремиссии
фрагмент бредовых переживаний, сохраняющийся после значительной редукции психоза
актуализация прежних бредовых идей на фоне их полной редукции

Галлюцинаторно-параноидный синдром это:

фантастический бред в сочетании с галлюцинациями
бред преследования, воздействия с кататоническими включениями
бред преследования, воздействия с психическими автоматизмами и псевдогаллюцинациями

В определение какого синдрома входит понятие необратимости:

аментивный
амнестический
деменция

Этиологические факторы олигофрении в зависимости от времени воздействия:

разделяются
на наследственные
на внутриутробные
все перечисленное

Характерными клиническими проявлениями дебильности являются:

- слабость абстрактного мышления
- неумение использовать знания для решения практических задач
- все перечисленное

Психозы у больных олигофрениями развиваются:

- во всех случаях
- в большей части случаев
- редко, при наличии дополнительных провоцирующих факторов

К целям лечения больных дебильностью относятся:

- обучение в объеме программы начальной школы
- воспитание
- все перечисленное

Из перечисленных форм олигофрении можно предупредить развитие болезни своевременным лечением новорожденного:

- при болезни Дауна
- при фенилкетонурии
- при тяжелой врожденной гидроцефалии

Укажите наиболее частую причину задержки психического развития:

- наследственность
- социальная запущенность
- родовые травмы

Врожденное слабоумие (олигофрения) проявляется:

- дебильностью
- имбецильностью
- все перечисленное

Олигофрении обусловлены недоразвитием мозга в связи:

- с перинатальными вредностями
- с травмами в родах
- все перечисленное

Максимальная задача в реабилитации больных идиотией состоит в научении:

- азбуке
- простым арифметическим действиям
- навыкам самообслуживания

Для болезни Дауна характерно все перечисленное, кроме:

- развития болезни у женщин
- развития болезни у мужчин
- сохранения репродуктивных функций

Выберите симптомы, характерные для патологии мышления при шизофрении:

- резонерство
- разорванность
- все перечисленное

Отметьте симптомы, характерные для патологии мышления при эпилепсии:

детализация
обстоятельность
все перечисленное

Термин "шперрунг" используется для обозначения переживания больным:
возникновения чуждых мыслей
внезапной остановки, обрыва мыслей
скачки идей

Возникновение синдрома сверхценных идей тесно связан с событиями:
не связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен
связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен
эмоционально значимыми для больного

К какому из приведенных ниже типов формальных расстройств мышления относится оторванность от реальности, погруженность в мир внутренних переживаний:

болезненно замедленное мышление
резонерское мышление
аутистическое мышление

Укажите характерные для ускоренного процесса мышления признаки:
отвлекаемость внимания
поверхностность ассоциаций
все перечисленное

Бредовое настроение характеризуется всем перечисленным, кроме:
напряженного предчувствия надвигающейся катастрофы
четко оформленного бреда преследования
необъяснимого мучительного беспокойства

Для интерпретативного бреда (бреда толкования) характерны:
политематичность бреда
внутренняя логика доказательств и систематизация бреда
отсутствие систематизации

Синдром чувственного (образного) бреда характеризуется:
монотематичностью бреда
выраженностью аффекта тревоги, страха
повышенным фоном настроения

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны слуховые истинные галлюцинации:
синдром Кандинского-Клерамбо
синдром дереализации
вербальный галлюциноз

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны псевдогаллюцинации:
синдром Кандинского-Клерамбо
синдром дереализации
синдром деперсонализации

Для какого синдрома характерен мегаломанический бред:

делириозный синдром
аментивный синдром
парафренный синдром

Для какого синдрома характерен острый чувственный бред:

параноидный синдром
парафренный синдром
астенический синдром

Для каких синдромов характерно переживание вкладывания и отнятия мыслей:

кататонический синдром
синдром Кандинского-Клерамбо
аментивный синдром

Для какого синдрома характерно бессвязное мышление:

кататонический синдром
синдром Кандинского-Клерамбо
аментивный синдром

Какой из нижеперечисленных симптомов не укладываются в структуру синдрома Кандинского-Клерамбо:

истинные вербальные галлюцинации
псевдогаллюцинации
бред воздействия

Инкогерентное (бессвязное) мышление характерно:

для делириозного синдрома
для аментивного синдрома
для синдрома Кандинского-Клерамбо

Для параноидного синдрома характерны следующие симптомы:

эхолалия
психические автоматизмы
инкогеренция мышления

Какие патологические идеи характерны для параноидного синдрома:

навязчивые идеи
сверхценные идеи ревности
бредовые идеи преследования и воздействия

Бред ревности может встречаться:

при алкогольных психозах
при сосудистых психозах
все перечисленное

Навязчивый страх (фобия) характеризуется:

периодическим произвольным повторением
конкретным содержанием
все перечисленное

Какие из перечисленных действий и движений относятся к ритуалам:

сопряженные с навязчивыми страхами
привычно повторяющиеся действия или движения
тикозные движения

В основе Корсаковского синдрома лежит:

инкогеренция мышления
расстройство ощущения
фиксационная амнезия

Заполнение пробелов памяти событиями, которые имели или могли иметь место в жизни больного называется:

ретроградная амнезия
криптомнезия
псевдореминисценции

Заполнение пробелов памяти событиями, которые носят фантастический нелепый характер и не могли иметь место в жизни больного называется:

ретроградная амнезия
криптомнезия
конфабуляции

В клинической картине Корсаковского синдрома наблюдаются:

псевдореминисценции
фиксационная амнезия
все перечисленное

При каком из перечисленных психопатологических синдромов часто встречается гипомнезия:

параноидный
кататонический
депрессивный

Препараты каких групп имеют терапевтическое значение для лечения мнестических расстройств:

нейролептики
ноотропы
транквилизаторы

Фиксационная амнезия характеризуется:

потерей способности запоминать текущие события
снижением интеллекта
галлюцинациями

При Корсаковском синдроме больной

может сохранять профессиональные навыки
способен продолжать профессиональную деятельность
способен к приобретению новых знаний

Прогрессирующий распад памяти от недавно приобретённой информации к давно приобретённой называется:

синдромом Кандинского-Клерамбо
Корсаковским синдромом

законом Рибо

Подробное произвольное воспроизведение давно полученной информации называется:

гипермнезией
экмнезией
хорошей памятью

Для какого синдрома характерна триада Протопопова:

парафренного
параноидного
депрессивного

Что из числа нижеперечисленного наиболее характерно для соматогенной депрессии:

суточные колебания настроения
витальное снижение настроения
утяжеление депрессии с утяжелением соматического состояния

Выделите из предложенных симптомов наиболее характерные соматические признаки депрессии:

снижение либидо
потеря в весе
все перечисленное

Укажите характеристики астенического синдрома:

эмоциональная лабильность
повышенная утомляемость
все перечисленное

Ипохондрический синдром может включать в себя:

фобии с переживанием заболеть неизлечимой болезнью
бредовую убежденность в несуществующей болезни
все перечисленное

Для маниакально-депрессивного психоза характерно:

тенденция к рецидивам аффективных приступов
возможность перехода одной фазы в другую без светлого промежутка
все перечисленное

Факторами риска суицидального поведения могут являться:

депрессивные состояния
бредовые идеи виновности
все перечисленное

Вероятность суицидального поведения у психически больных может возрастать в случае:

мыслей о бесцельности существования
мыслей о беспросветности будущего
все перечисленное

При каком синдроме встречается следующая триада симптомов: повышенное, радостное настроение, ускоренное мышление, повышенная двигательная

активность:

парафренном
депрессивном
маниакальном

При каком синдроме встречается следующая триада симптомов: тоскливо-печальное настроение, замедленное мышление, двигательная заторможенность:

маниакальном
кататоническом
депрессивном

Для какого синдрома характерно пароксизмально возникающее тоскливо-злобное настроение с склонностью к агрессивным действиям:

депрессивного
обсессивного
дисфорического

Укажите правильные утверждения относительно бредовых идей при маниакально-депрессивном психозе:

характерны бредовые идеи преследования
бред носит первичный характер
бредовые идеи соответствуют расстройству аффекта

К какой группе синдромов относится дисфория:

бредовым
синдромам нарушения сознания
аффективным

Какой из нижеперечисленных признаков, симптомов является характерным, отличающим маскированные депрессии от других депрессий:

бредовые идеи самоуничтожения и самообвинения
навязчивые страхи
преобладание соматических жалоб

Какому из числа нижеперечисленных описаний, определений соответствует понятие маскированной депрессии:

выражен аффективный компонент депрессивной триады. Идеаторный компонент выражен слабо. Двигательная заторможенность отсутствует
имеется выраженная двигательная и психическая заторможенность. Аффективный компонент выражен слабо
двигательная и психическая заторможенность не выражены. Депрессивный аффект выражен слабо. Его место занимают соматические жалобы

Какой из нижеперечисленных признаков, симптомов является характерным, отличающим маскированные депрессии от других депрессий:

бредовые идеи самоуничтожения и самообвинения
суточные колебания настроения
жалобы со стороны внутренних органов

Какая из перечисленных групп препаратов наиболее эффективна при лечении маскированных депрессий:

транквилизаторы

психостимуляторы
антидепрессанты

Классическая маниакальная триада включает в себя:

повышенное настроение
ускорение ассоциаций
все перечисленное

Для депрессивного синдрома характерны:

переживание тоски
двигательная заторможенность
все перечисленное

Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза характерно все перечисленное, исключая:

наличие депрессивной триады
идеи самообвинения
идеи переоценки собственной личности

При каких из перечисленных депрессий наблюдается наибольшая вероятность суицидных попыток:

тревожной (ажитированной) депрессии
астенической депрессии
слезливой депрессий

К атипичным признакам МДП относятся:

бред самоуничужения
двигательное возбуждение
слуховые галлюцинации

Для клиники циклотимии характерно:

малая интенсивность аффективных расстройств в фазах
переживание болезненности состояния в мании
ничего из перечисленного

Суицидальное поведение может протекать в форме:

упорных суицидальных высказываний
стремлений к самоубийству
все перечисленное

Что может служить критерием отличия кататонического ступора от депрессивного:

степень выраженности
продолжительность
негативизм, повышение мышечного тонуса

Укажите совокупность признаков, которые соответствуют утверждению: "для кататонического возбуждения характерно"

постоянное стремление к деятельности, повышенная отвлекаемость, целенаправленность действий
стереотипия, импульсивность, неестественность движений, паясничанье, эхолалия, эхопраксия
злобно-тоскливое настроение, суженное сознание, устрашающие галлюцинации, бред

преследования

Кататоническое возбуждение представляет опасность агрессии:

для случайных лиц
для самого больного
все перечисленное

Онейроидная кататония проявляется:

помрачением сознания
зрительными галлюцинациями
все перечисленное

Люцидная (пустая) кататония проявляется:

помрачением сознания
обездвиженностью
зрительными галлюцинациями

Гипербулия проявляется всем перечисленным, кроме:

повышения волевой активности, усиления побуждений
повышенной деятельности
чувства сделанности состояния

Какой клинический симптом не характерен для кататонического синдрома:

эксимптомы
каталепсия
дисфории

Апато-абулический синдром обычно наблюдается в клинике:

пресенильных психозов
сенильных психозов
шизофрении

Какие из нижеперечисленных симптомов характерны для кататонического ступора:

немотивированность поступков
конфабуляции
негативизм

Тревожное возбуждение проявляется:

общим двигательным беспокойством
тревогой, страхом
все перечисленное

Снижение активности считается характерным:

для паранойяльных синдромов
для астенических состояний
для сумеречного расстройства сознания

Импульсивное возбуждение отличается от других видов возбуждения:

гипертимией
немотивированностью возбуждения
четкой целенаправленностью

К какой форме расстройства сознания относится транс и сомнамбулизм:

- аментивное
- сумеречное
- онейроидное

Для какого из указанных синдромов характерно внезапное начало и окончание (часто заканчивается сном), полная амнезия:

- делирий
- сумеречное расстройство сознания
- амнезия

Общими для всех синдромов помрачения сознания являются

- нарушение отражения реального мира
- дезориентировка в месте и времени
- все перечисленное

Мусситирующий (бормочущий) делирий проявляется всем перечисленным, исключая:

- резкое двигательное возбуждение с агрессией
- хаотическое беспорядочное возбуждение обычно в пределах постели
- невнятное бессвязное бормотание

Оглушение может проявляться:

- дезориентировкой в месте и времени
- аспонтанностью
- все перечисленное

Сумеречное помрачение сознания характеризуют во всех случаях:

- внезапное начало и критический выход
- постепенное начало в течение суток
- частичная амнезия переживаний

Укажите какой этиологический фактор играют ведущую роль в возникновении делириозных состояний:

- токсический фактор
- психогенный фактор
- генетические фактор

Для какого синдрома характерно грубое расстройство мышления, обусловленное нарушением синтеза ассоциаций:

- кататонический синдром
- маниакальный синдром
- аментивный синдром

При каком синдроме характерно преобладание зрительных устрашающих галлюцинаций:

- кататонический синдром
- синдром Кандинского-Клерамбо
- делириозный синдром

К какой психопатологической группе расстройств относится онейроидный синдром:
помрачение сознания

выключение сознания
патологии мышления

Какие симптомы из нижеперечисленных характерны для аменции:

бессвязное, инкогерентное мышление
систематизированный бред преследования
частичная амнезия

Для какого из перечисленных психопатологических синдромов наиболее свойственна истощаемость внимания:

маниакального
астенического
депрессивного

Для каких из перечисленных заболеваний характерно затруднение переключения внимания:

шизофрении
инволюционный психоз
эпилепсия

Оглушение может развиваться в следствие:

интоксикаций
шизофрении
инволюционного психоза

Для делирия характерны все перечисленные психические расстройства, кроме:

парейдолии
зрительных галлюцинаций
психических автоматизмов

Для мусситирующего делирия характерно все перечисленное, кроме:

возбуждения в пределах постели
бессвязного бормотания
гипертимии

Для профессионального делирия характерно:

глубокое помрачение сознания
автоматизированные двигательные акты
все перечисленное

Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе негативных расстройств, встречающихся при шизофрении:

псевдогаллюцинации
бред воздействия
гипобулия

Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе позитивных расстройств, встречающихся при шизофрении:

снижение памяти
эмоциональное уплощение
бред

Какой клинический признак свидетельствует о формировании у больного черт шизофренического дефекта:

- нарушение памяти
- снижение волевой активности
- депрессивное состояние

Какое нарушение психосенсорного синтеза в большей степени характерно для шизофрении:

- нарушение восприятия формы предметов
- нарушения схемы тела
- деперсонализация

Какие из перечисленных нарушений мышления свойственны шизофрении:

- разорванное мышление
- аутистическое мышление
- все перечисленное

Для приступа фебрильной шизофрении характерно:

- повышение температуры тела
- угроза жизни больного
- все перечисленное

В рамках какого заболевания чаще всего встречается кататоническая симптоматика:

- маниакально-депрессивный психоз
- эпилепсия
- шизофрения

Какое из нижеперечисленных заболеваний, как правило, имеет тенденцию к регрессиентному течению:

- травматическое поражение головного мозга
- шизофрения
- алкоголизм

Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерные для шизофрении:

- слабодушие
- эйфория
- эмоциональная неадекватность

Какая форма шизофрении протекает наиболее злокачественно и приводит к выраженным изменениям личности:

- параноидная шизофрения
- паранойяльная шизофрения
- гебефреническая шизофрения

Какой психопатологический синдром не встречается при шизофрении:

- апатобулический
- сенестопатический
- Корсаковский

Какие из перечисленных эмоциональных расстройств присущи шизофрении:

неадекватность эмоций
амбивалентность
все перечисленное

Какие из перечисленных исходов заболевания не свойственны параноидной форме шизофрении:

летальный исход
выход в длительную ремиссию
непрерывное хроническое течение

При какой форме шизофрении апато-абулические расстройства определяют клиническую картину заболевания:

простой форме
гебефренической форме
параноидной форме

Парафренный синдром характеризуется:

слабоумием
амнезией
выраженной разорванностью мышления и нелепостью суждений

Для эмоциональной сферы больных шизофренией характерно:

прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций
неадекватность эмоциональных реакций
все перечисленное

Для рекуррентной шизофрении является характерным:

однообразие приступов (типа клише)
благоприятность течения
все перечисленное

Для вялотекущей шизофрении свойственно:

медленное течение с постепенным развитием изменений личности
галлюцинаторные и бредовые расстройства
значительная глубина аффективных расстройств (психотические депрессии, мании)

Приступообразно-прогредиентная шизофрения характеризуется:

только терапевтическими ремиссиями
усложнением симптоматики с очередным приступом
однотипными (типа клише) приступами

Что из числа нижеперечисленного более характерно для острого периода черепно-мозговой травмы:

депрессивный синдром
делириозный синдром
онейроид

Для какого из перечисленных ниже заболеваний характерно наличие резидуальных расстройств:

маниакально-депрессивный психоз
травматическая энцефалопатия
реактивная депрессия

Гипертонический криз может сопровождаться:

синдромами помрачения сознания
выраженной тревогой
все перечисленное

Для острого периода сотрясения головного мозга характерно все перечисленное, кроме :

головокружения
тошноты, рвоты
локальных неврологических симптомов (параличей, парезов, анестезий, гиперстезий)

В периоде отдаленных последствий черепно-мозговой травмы могут развиваться

судорожные припадки
парафренный синдром
маниакальный синдром

Лечение астенических и психопатоподобных расстройств отдаленного периода черепно-мозговой травмы включает:

общеукрепляющую терапию
нейролептическую терапию
все перечисленное неверно

Смысл концепции об экзогенном типе реакций заключается в том, что:

различные экзогенные вредности вызывают общие типы реакций
каждой экзогенной вредности соответствует свой тип реакции
любая реакция экзогенного типа является проявлением скрытого эндогенного заболевания

Для психоорганического синдрома характерно:

снижение памяти
снижение интеллекта
все перечисленное

Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерное для сосудистых заболеваний головного мозга :

эмоциональная холодность
эмоциональная неадекватность
слабодушие

При выраженных сосудистых заболеваниях головного мозга снижение интеллектуально-мнестических функций наблюдается:

в единичных случаях
в большинстве случаев
во всех случаях

Какие психопатологические проявления эпилептической болезни могут ошибочно расцениваться как соматические заболевания?

большие судорожные припадки
сумеречное расстройство сознания
парциальные припадки

Какой дифференциально-диагностический критерий истерического и эпилептического припадков имеет наиболее существенное значение:

выключение сознания

продолжительность припадков

возможность прикуса языка и слизи во время припадков

Эпилептический статус характеризуется:

серией следующих друг за другом больших эпилептических припадков

серией следующих друг за другом больших эпилептических припадков, между которыми пациент не приходит в сознание

пребыванием больного в состоянии выключенного сознания после судорожного припадков

Эпилептическая аура:

встречаются у всех больных эпилепсией

амнезируется больным

все перечисленное неверно

Амбулаторные автоматизмы включают в себя:

абсансы

трансы

дисфории

К какому виду припадков относятся Джексоновские припадки:

фокальные (парциальные) судорожные

генерализованные судорожные

абсансы

Что из перечисленного имеет наибольшее значение для разграничения судорожной реакции от генерализованного судорожного припадков в рамках эпилепсии:

отсутствие амнезии

продолжительность припадков

отсутствие изменений на ЭЭГ, характерных для эпилепсии

Что из нижеперечисленного характерно для эпилептического изменения личности:

ригидность аффекта

гипертрофированная пунктуальность

все перечисленное

Какие из перечисленных ниже препаратов обладают противосудорожным эффектом?

аминазин

мажептил

карбамазепин (финлепсин)

К генерализованным припадкам относятся:

абсансы

джексоновские припадков

вегетативный (диэнцефальный) припадков

Выберите наиболее адекватный препарат для неотложной помощи при эпилептическом статусе:

сульфат магния

аминазин

диазепам

Эпилепсия - хроническое заболевание, характеризующееся следующими признаками:
разнообразными пароксизмальными расстройствами
типичными изменениями личности
все перечисленное

Изменения личности при эпилепсии характеризуются следующими признаками
обстоятельностью мышления
эксплозивностью
все перечисленное

Острые эпилептические психозы подразделяются на следующие группы:
острые эпилептические психозы с помрачением сознания
острые эпилептические психозы без помрачения сознания
все перечисленное

Хронические эпилептические психозы проявляются:
галлюцинаторнопараноидными состояниями
кататоническими расстройствами
ничем из перечисленного

Инволюционные депрессии:
имеют тенденцию к затяжному течению
имеют тенденцию к рецидивам
все перечисленное

Признаками группы атрофических процессов головного мозга являются:
незаметное начало заболевания
неуклонно прогрессивное течение
все перечисленное

Укажите личностные изменения, наиболее характерные для сенильной деменции:
эгоцентризм
эмоциональное огрубение
все перечисленное

Инволюционная депрессия может быть представлена:
ажитированной депрессией
депрессией с бредом Котара
все перечисленное

Фабула инволюционных параноидов складывается:
из идей ущерба
из идей отравления
все перечисленное

Течение инволюционных бредовых психозов чаще всего носит:
хронический характер
приступообразный характер
периодический характер

Какой вид лечения инволюционных бредовых психозов обычно применяется:

нейролептики
антидепрессанты
ЭСТ

Для личностных изменений при болезни Альцгеймера с поздним началом (сенильной деменции) характерно:

расторможение низших влечений
упрямство и ригидность
все перечисленное

Наиболее информативным методом исследования атрофических процессов головного мозга из нижеперечисленного является:

ЭЭГ
компьютерная томография
исследование ликвора
УЗИ головного мозга

Афазии, апраксии, агнозии наиболее характерны для:

сосудистой деменции
болезни Пика
болезни Альцгеймера

Для начальной стадии болезни Пика характерно:

изменение личностных черт
эйфорический оттенок настроения
все перечисленное

В формировании психической травмы имеет значение:

тяжесть психотравмирующего фактора
слабость механизмов психологической защиты
все перечисленное